



ПРАКТИЧНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Для вигодування молозивом слабких поросят



Пакетики молозива об'ємом 200 мл необхідно зберігати в морозильній камері (-18 °C / -1 °F або нижче).



Пакети розморожують на водяній бані в теплій воді (45-55 °C / 113-131 °F) протягом 30 хвилин перед використанням. **ПРИМІТКА:** При температурі вище 60 °C / 140 °F важливі поживні речовини руйнуються.

Продукт слід використати негайно після розморожування (температура вигодування приблизно 30-40 °C / 86-104 °F) протягом 3-4 годин.



Вимийте руки. Пакет розкривається шляхом розрізання його чистими ножицями. Потім вміст пакету виливається в пластикову пляшку з різьбленням 25 мм / 1 дюйм і кріпиться до вакцинаційного шприца Dreschl - або налитийте у одноразову пляшечку для сперми.



Почніть годування:

Усіх слабких поросят у посліді годують стільки, скільки вони можуть з'їсти, кожні дві години протягом кількох днів після народження.

Мінімум 6-7 разів протягом перших 24 годин.



Залишок у пляшечці/шприці слід використати або викинути протягом 5 годин після розморожування, щоб обмежити ріст шкідливих бактерій.



Після кожного годування використовуваний інвентар слід ретельно промивати гарячою водою (ми рекомендуємо 60-70 °C / 140-158 °F).

Пляшки для сперми одноразові, але їх можна використовувати повторно після ретельного очищення.